



PLAN DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA w przypadku złego stanu zdrowia dziecka

Kiedy należy wystać chore dziecko do domu?

1. Dziecko jest zbyt chore, aby pozostać w przedszkolu, jeżeli z powodu złego samopoczucia nie jest w stanie uczestniczyć w zajęciach

LUB

2. jeśli jego stan wymaga fachowej opieki

LUB

3. jeśli naraża inne dzieci na zarażenie się chorobą.

Objawy zaobserwowane u dziecka, upoważniające nauczyciela do poinformowania rodziców o konieczności zabrania dziecka do domu:

- ✓ **SKÓRA:** jeżeli na skórze pojawia się wysypka i temperatura ciała dziecka jest podwyższona LUB jeśli wysypce towarzyszą zmiany w zachowaniu dziecka LUB jeśli dziecko ma liszajec (swędzące, pęcherzykowe wypryski na skórze);
- ✓ **OCZY:** ropne zapalenie spojówek (białko oka jest żółtawozielone lub zaczerwienione, a w oku zbiera się substancja ropna, która wycieka lub zasycha w oku);

- ✓ **ZACHOWANIE**: dziecko wykazuje symptomy zmęczenia LUB jest poirytowane, płacze częściej niż zwykle (szczególnie dzieci najmłodsze);
- ✓ **SYSTEM ODDECHOWY**: dziecko ma problemy z oddychaniem
- ✓ **SYSTEM TRAWIENIA**: dziecko ma biegunkę, w ciągu ostatnich 24 godzin zwracało przynajmniej dwa razy (chyba że wymioty nie są skutkiem choroby zakaźnej);
- ✓ **JAMA USTNA**: w jamie ustnej pojawiły się krostki lub owrzodzenie i ślina wycieka dziecku z ust;
- ✓ Symptomy poważnych chorób

Kiedy dziecko może wrócić do przedszkola?

Minimalne wymaganie ustalone przez lekarzy

- **WIETRZNA OSPA** – minimum 6 dni po pojawieniu się wysypki
- **LISZAJEC** – po 24 godz. od rozpoczęcia leczenia (z koniecznością powiadomienia nauczyciela i dyrektora placówki)
- **WSZY LUB ŚWIERZB** - następnego dnia po rozpoczęciu leczenia (z koniecznością powiadomienia nauczyciela i dyrektora)
- **ZAPALENIE SPOJÓWEK** – po 24 godz. od chwili rozpoczęcia leczenia

- **ŚWINKA** - 9 dni po zaobserwowaniu powiększonych gruczołów za uszami
- **ZAPALENIE GARDŁA LUB GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH** – po 24 godz. leczenia oraz po 24 godz. od chwili ustąpienia wysokiej temperatury
- **OWRZODZENIE JAMY USTNEJ** – w terminie ustalonym przez lekarza
- **KOKLUSZ** – po 5-dniowym okresie zażywania antybiotyków
- **ODRA** – 4 dni od chwili całkowitego zniknięcia wysypki
- Inne poważne choroby zakaźne - w terminie ustalonym przez lekarza

Inne zalecenia lekarzy :

- ➔ Przedszkole zawiadamia rodziców o chorobie dziecka i odseparowuje je od innych dzieci , jeżeli w jego oczach i nosie zaobserwowano zielonkawą lub żółtawą flegmą, jeżeli dziecko kaszle flegmą LUB jeśli odczuwa ból zęba, gardła, ucha albo odczuwa mdłości, nawet jeśli temperatura ciała nie jest podwyższona.
- ➔ Rodzice powinni zaprowadzić chore dziecko do lekarza i stosować się do jego zaleceń